

## ĻAUNDABĪGO AUDZĒJU PRIMĀRĀ DIAGNOSTIKA PACIENTU NOSŪTĪŠANAI UZ "ZAĻO KORIDORU" (īkdienas lietošanai ārsta praksē)

Diagnozes kods un nosaukums Simptomi	Kādi izmeklējumi jāveic apskates laikā?	Kādi izmeklējumi tiek nodrošināti jebkurā NVD līgumiestādē 10 darba dienu laikā virs kvotas?	Kur nosūta pacientu ar pozitīvas atradnes izmeklējumu rezultātiem?
<p><b>AIZKUŅĢA DZIEDZERIS</b> <b>Z03.125</b> Izmeklēšana iespējama aizkuņģa dziedzera ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><u>Iespējamie simptomi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ≥ 40 gadiem ir dzelte.</li> <li>- ≥ 60 gadiem ir svāra zudums un kāds no simptomiem: caureja; sāpes mugurā; sāpes vēderā; šķebinašana; vemšana; aizcietējums; nesen sācies diabēts.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ādas apskate (novērtēt dzelti, kaheksiju, bālumu, turgoru).</li> <li>- Vēdera palpācija (novērtēt sāpīgumu, veidojumus).</li> <li>- Cirkšņu limfmezglu palpācija.</li> </ul>	<p><u>Laboratoriskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilna asins aina un EGĀ, izvērtējot anēmiju, leukocitozi un EGĀ.</li> <li>- Bioķīmija – bilirubīns, ALAT, GGT, SF, LDH, kreatinīns, glikoze.</li> <li>- Koprogramma – steatorejas esamība.</li> </ul> <p><u>Radioloģiskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vēdera dobuma USG.</li> <li>- Vēdera dobuma CT ar kontrastvielu, ja ir pozitīva atradne laboratoriskajos izmeklējumos un vēdera dobuma USG.</li> </ul>	<p><u>Pie ķirurga:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAKUS</li> <li>- PSKUS</li> <li>- Daugavpils reģ. slimnīca</li> <li>- Liepājas reģ. slimnīca</li> <li>- Piejūras slimnīca</li> </ul>
<p><b>AKNAS, ŽULTSCEĻI, ŽULTSPŪSLIS</b> <b>Z03.122</b> Izmeklēšana iespējama aknu un intrahepatisko žultsvadu ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><b>Z03.123</b> Izmeklēšana iespējama žultspūšļa ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><b>Z03.124</b> Izmeklēšana iespējama citu un neprecizētu žultsceļu daļu ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><u>Iespējamie simptomi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neskaidras etioloģijas kāds no simptomiem: dzelte; ascīts; slikta dūša un/vai vemšana; izmainīti aknu funkcionālie rādītāji.</li> <li>- Sāpes labajā parībā.</li> <li>- Svāra zudums.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nosaka aknu vēža riska faktoru - aknu ciroze un kāds no iemesliem, kas to izraisījis: B vai C hepatīts; alkohols; pārmantotā hemohromatoze; aknu steatoze; primāras biliāras cirozes IV pakāpe; α-1-antitripsīna deficīts; citi iemesli.</li> <li>- Nosaka aknu vēža riska faktoru – nav aknu cirozes, bet ir B hepatīta nēsātājs.</li> <li>- Ādas apskate (novērtēt dzelti, kaheksiju, bālumu, turgoru).</li> <li>- Reģionālo limfmezglu palpācija.</li> <li>- Vēdera palpācija (novērtēt sāpīgumu, veidojumus).</li> <li>- Aknu palpācija (novērtēt aknu robežas, aknu malas virsmu, konsistenci, izmērus).</li> </ul>	<p><u>Laboratoriskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilna asins aina un EGĀ, izvērtējot anēmiju, leukocitozi un EGĀ.</li> <li>- Bioķīmija – bilirubīns (tiešais, netiešais, kopējais), ALAT, SF, GGT, albumīns, urīnviela, kreatinīns, α-fetoproteīns (&gt;100 ng/ml un ≥7ng/ml/mēnesī (vismaz trīs noteikšanas reizēs)).</li> <li>- Koagulogramma – protrombīna laiks, INR, APTL.</li> <li>- Nieru funkcionālo rādītāju noteikšana, ja plānoti izmeklējumi ar kontrastvielu.</li> </ul> <p><u>Radioloģiskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vēdera dobuma USG.</li> <li>- Vēdera dobuma CT ar kontrastvielu, ja ir pozitīva atradne laboratoriskajos izmeklējumos un USG.</li> </ul>	<p><u>Pie ķirurga ar specializāciju aknu ķirurģijā vai hepatologa, vai gastroenterologa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAKUS</li> <li>- PSKUS</li> <li>- Daugavpils reģ. slimnīca</li> <li>- Liepājas reģ. slimnīca</li> <li>- Piejūras slimnīca</li> </ul>
<p><b>ĀDA (IZŅEMOT MELANOMU)</b> <b>Z03.144</b> Izmeklēšana iespējama citu ļaundabīgu ādas audzēju dēļ</p> <p><u>Iespējamie simptomi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ilgstoši nedzīstošs ādas pušums, plaisājums, apsārtums, zvīņošanās vai kreveļošānās.</li> <li>- Nesāpīgs ādas izcīlnis (perlamutrveida mezgliņš), kas pakāpeniski palielinās, veidojums ar vaļņveida malīņām.</li> <li>- Teleangiektāzijas pa veidojuma perifēriju.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ādas apskate (patoloģisku veidojumu izvērtēšana).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ādas nospieduma citoloģiska izmeklēšana.</li> </ul>	<p><u>Pie ķirurga vai mutes, sejas un žokļu ķirurga.</u> (ja ādas veidojuma lokalizācija ir uz sejas):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAKUS</li> <li>- PSKUS</li> <li>- Daugavpils reģ. slimnīca</li> <li>- Liepājas reģ. slimnīca</li> <li>- Piejūras slimnīca</li> </ul>

<b>Diagnozes kods un nosaukums</b> <b>Simptomi</b>	<b>Kādi izmeklējumi jāveic apskates laikā?</b>	<b>Kādi izmeklējumi tiek nodrošināti jebkurā NVD līgumiestādē 10 darba dienu laikā virs kvotas?</b>	<b>Kur nosūta pacientu ar pozitīvas atradnes izmeklējumu rezultātiem?</b>
<p><b>ĀDA (MELANOMA)</b>  <b>Z03.143</b>  Izmeklēšana iespējamas ļaundabīgas ādas melanomas dēļ</p> <p><u>Iespējamie simptomi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asimetrisks veidojums ar nelīdzenām virsmām un nevienmērīgā krāsojumā, kas laika gaitā mainās.</li> <li>- Dermatoskopiski aizdomas par malignitāti.</li> <li>- Palielināti reģionālie limfmezgli.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nosaka melanomas riska faktoros – vīrietis; ≥ 60 gadiem; atipiski vai displastiski pigmentveidojumi; ↑ pigmentveidojumu (liela izmēra) skaits; saules jutīgais ādas fenotips ar tendenci; I un II ādas tipi; multipli saules apdegumi ar/bez pūšļu veidošanos anamnēzē; ādas melanoma vai citi audzēji un vēzdraudes ādas slimības; imūnsupresīvi stāvokļi (pēc orgānu transplantācijas, pēc autologo vai allogēno cilmes šūnu transplantācijas, HIV vai AIDS); esoša pārmantota slimība (pigmentētā kseroderma); zināms melanomas jutības polimorfisms (CDKN2A, CDK4, MC1R un citas mutācijas); melanoma ģimenes anamnēzē; solārija izmantošana; ilgstoša uzturēšanās saulainā klimatā vai tuvu ekvatoram; periodiska, intensīva saules ekspozīcija (melanomām, kas lokalizētas ķermenī (rumpī) un/vai ekstremitāšu rajonā un saistītas ar lielu pigmentveidojumu skaitu); ilgstoša saules ekspozīcija (melanomām, kas lokalizējas galvas vai kakla vai augšējo ekstremitāšu rajonā un saistītas ar mazu pigmentveidojumu skaitu).</li> <li>- Ādas apskate (patoloģisku veidojumu izvērtēšana).</li> <li>- Reģionālo limfmezglu palpācija.</li> <li>- Aknu palpācija.</li> </ul>	<p>Ādas veidojumu apskate ar dermatoskopu, ja ārstam ir pieredze un attiecīgs aprīkojums.</p>	<p><u>Pie ķirurga vai mutes, sejas un žokļu ķirurga, (ja ādas veidojuma lokalizācija ir uz sejas):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAKUS</li> <li>- PSKUS</li> <li>- Daugavpils reģ. slimnīca</li> <li>- Liepājas reģ. slimnīca</li> <li>- Piejūras slimnīca</li> </ul>
<p><b>BRONHI, PLAUŠAS</b>  <b>Z03.134</b>  Izmeklēšana iespējama bronhu un plaušu ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><u>Iespējamie simptomi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neizskaidrojama asiņu atklepošana (punktīni, stīdziņas, putaini rozā krēpas, asiņu recekļi).</li> <li>- Smēķētājam vai bijušajam smēķētājam vecumā ≥50 gadiem ar 30 paciņu gadu smēķēšanas anamnēzi, novēro: persistējošu klepu ilgāk par 3 ned. vai novēro klepus rakstura pārmaiņas; sāpes krūtīs (elpojot, klepojot); aizdusu; sāpīgu elpošanu; persistējošu vai recidivējošu dziļo elpceļu (plaušu) infekciju; svāra zudumu.</li> <li>- Persistē vairāk nekā divi no sekojošiem bez konstatēta iemesla: smēķētājs vai bijušais smēķētājs; klepus ilgāk par trijām nedēļām vai novēro klepus rakstura pārmaiņas; sāpes krūtīs vai plecos (elpojot, klepojot); aizdusa; sāpīga elpošana; persistējošas vai biežas dziļo elpceļu (plaušu) infekcijas; paaugstināta ķermeņa temperatūra; svāra zudums; apetītes zudums; nogurums, nespēks; pulkstenstikla nagi; palielināti kakla, virs vai zem atslēgas kaula limfmezgli.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Noskaidro smēķēšanas anamnēzi: no kāda vecuma smēķē vai smēķējis; cik cigarešu dienā smēķē vai smēķējis; paciņģadu skaitu (cigarešu skaits dienā, reizināts ar smēķēšanas ilgumu gados).</li> <li>- Noskaidro arodkaitīgumu anamnēzē (piemēram, azbests).</li> <li>- Noskaidro saslimstību ar ļaundabīgiem audzējiem ģimenē;</li> <li>- Precizē iepriekš veikto krūšu kurvja orgānu izmeklējumu rezultātus.</li> <li>- Plaušu salīdzinošā perkusija un auskultācija.</li> </ul>	<p><u>Laboratoriskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilna asins aina.</li> <li>- Bioķīmija – ALAT, CRO.</li> <li>- Krēpu (ja tādas ir) mikrobioloģisko izmeklēšanu uz <i>M.tuberculosis</i>.</li> </ul> <p><u>Radioloģiskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RTG krūškurvim.</li> </ul>	<p><u>Pie pneimonologa vai torakālā ķirurga:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAKUS</li> <li>- PSKUS</li> <li>- Daugavpils reģ. slimnīca</li> <li>- Liepājas reģ. slimnīca</li> </ul>

<b>Diagnozes kods un nosaukums</b> <b>Simptomi</b>	<b>Kādi izmeklējumi jāveic apskates laikā?</b>	<b>Kādi izmeklējumi tiek nodrošināti jebkurā NVD līgumiestādē 10 darba dienu laikā virs kvotas?</b>	<b>Kur nosūta pacientu ar pozitīvas atradnes izmeklējumu rezultātiem?</b>
<p><b>CENTRĀLĀ NERVU SISTĒMA</b></p> <p><b>Z03.170</b> Izmeklēšana iespējama smadzeņu apvalku ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><b>Z03.171</b> Izmeklēšana iespējama smadzeņu ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><b>Z03.172</b> Izmeklēšana iespējama muguras smadzeņu, kraniālo nervu u.c. centrālās nervu sistēmas daļas ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><u>Iespējamie simptomi:</u> Īsā laika periodā attīstījušies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pirmreizēja epileptiska lēkme.</li> <li>- Pēkšņas, patvaļīgas muskuļu kustības vai krampji.</li> <li>- Pieaugošas, atkārtotas automātiskas kustības, piemēram, kakla slīpuma maiņa vai šķielēšana.</li> <li>- Neizskaidrojama slikta dūša vai pēkšņa vemšana ar strūklu.</li> <li>- Pārvietošanās vai līdzsvara traucējumi.</li> <li>- Neskaidras etioloģijas, strauji progresējoši samaņas un/vai redzes un/vai uztveres traucējumi.</li> <li>- Pakāpeniski pieaugoši jušanas traucējumi.</li> <li>- Hroniskas, progresējošas nakts vai rīta galvassāpes.</li> <li>- Topiska neiroloģiska simptomātika, kas norāda uz iespējamu muguras smadzeņu bojājumu un tā līmeni, piemēram, parēzes vai jušanas vai urinācijas vai vēdera izejas traucējumi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neiroloģiskā stāvokļa noteikšana (novērtēt kustības, jušanas, koordinācijas un uztveres sfēru).</li> <li>- Muskuļu spēka pārbaude.</li> <li>- Redzes pārbaude.</li> <li>- Līdzsvara un pārvietošanās pārbaude.</li> <li>- Mugurkaula apskate un palpācija.</li> </ul>		<p><u>Pie neirologa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAKUS</li> <li>- PSKUS</li> <li>- Daugavpils reģ. slimnīca</li> <li>- Liepājas reģ. slimnīca</li> </ul>
<p><b>DZEMDES ĶĒRMENIS</b></p> <p><b>Z03.154</b> Izmeklēšana iespējama dzemdes ķermeņa ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><b>Z03.155</b> Izmeklēšana iespējama neprecizētas daļas dzemdes ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><u>Iespējamie simptomi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neizskaidrojama vagināla asiņošana menopauzē (&gt;12 mēnešus pēc pēdējām menstruācijām).</li> <li>- ≥55 gadiem ir neskaidri izdalījumi no maksts, kurus: konstatē pirmo reizi menopauzē; pavada trombocitoze; pavada mikro vai makrohematūrija.</li> <li>- ≥55 gadiem ir makrohematūrija, t.sk. ar kādu no simptomiem: zems hemoglobīna līmenis; trombocitoze; paaugstināts glikozes līmenis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ādas apskate (novērtēt dzelti, bālumu, turgoru, aptaukošanos).</li> <li>- Vēdera lejas daļas un cirkšņu apvidus palpācija.</li> </ul>	<p><u>Laboratoriskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilna asins aina un EGĀ, izvērtējot anēmiju, trombocitozi un EGĀ.</li> <li>- Bioķīmija – SF, LDH, kreatinīns, glikoze.</li> </ul> <p><u>Radioloģiskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transvagināla USG.</li> </ul>	<p><u>Pie ginekologa vai onkoloģijas ginekologa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAKUS</li> <li>- PSKUS</li> <li>- Daugavpils reģ. slimnīca</li> <li>- Liepājas reģ. slimnīca</li> <li>- Piejūras slimnīca</li> </ul>

Diagnozes kods un nosaukums Simptomi	Kādi izmeklējumi jāveic apskates laikā?	Kādi izmeklējumi tiek nodrošināti jebkurā NVD līgumiestādē 10 darba dienu laikā virs kvotas?	Kur nosūta pacientu ar pozitīvas atradnes izmeklējumu rezultātiem?
<p><b>HODŽKINA LIMFOMA</b> <b>Z03.181</b> Izmeklēšana iespējamas Hodžkina limfomas dēļ</p> <p>Iespējamie simptomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No 18-30 gadiem un &gt;55 gadiem ir palielināti limfmezgli, kas ir nesāpīgi, &gt;0.5cm, asimetriski un blīvi;</li> <li>- Neizskaidrojama paaugstināta ķermeņa temperatūra &gt; 38°C;</li> <li>- Profūza svīšana naktīs;</li> <li>- Svara zudums vairāk kā 10% 6 mēnešu laikā;</li> <li>- Ģeneralizēta ādas nieze, īpaši palielināto limfmezglu rajonā.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatūras mērīšana;</li> <li>- Taustei pieejamo perifēro limfmezglu palpācija;</li> <li>- Liesas palpācija;</li> <li>- Aknu apvidus palpācija (sāpīgums, aknu robežas, aknu malas konsistence, izmēri);</li> <li>- Ādas novērtēšana (bālums, kaheksija, turgors);</li> <li>- Plaušu auskultācija</li> </ul>	<p><u>Laboratoriskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilna asins aina un EGĀ, izvērtējot anēmiju, leukocitozi, limfocitopēniju un EGĀ;</li> <li>- Asins bioķīmija: ALAT, tiešais, netiešais, kopējais bilirubīns, kreatinīns, glikoze;</li> <li>- Koagulogramma – protrombīna laiks, APTL;</li> <li>- Virusu specifiskās antivielas: anti-EBV IgM, anti-EBV IgG, anti-EBV kodola antigēnu (EBNA), HBsAg, anti-HBc IgM, anti-HIV1, HIV2 ar ELISA testu, ja antivielas pozitīvas, veic anti-HIV1 un/vai HIV2 noteikšanu ar Westernblot testu, anti-HCV ar ELISA testu, ja antivielas pozitīvas, veic anti-HCV noteikšanu ar Westernblot testu.</li> </ul> <p><u>Radioloģiskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limfmezglu ultrasonogrāfija;</li> <li>- Krūšu kurvja orgānu rentgenogrāfija;</li> <li>- Vēdera dobuma ultrasonogrāfija.</li> </ul>	<p><u>Pie hematologa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAKUS</li> <li>- Daugavpils reģ. slimnīca</li> <li>- Liepājas reģ. slimnīca</li> <li>- Piejūras slimnīca</li> </ul>
<p><b>KRŪTS</b> <b>Z03.150</b> Izmeklēšana iespējama krūts ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><u>Iespējamie simptomi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ≥ 30 gadiem neskaids veidojums krūtī vai padusē ar/bez sāpēm.</li> <li>- ≥ 50 gadiem sūdzības saistībā ar viena krūts gala izdalījumiem vai ievilkumiem vai cita veida pārmaiņām uz krūts gala.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Krūšu un padušu apvidus apskate (novērtēt deformāciju, asimetriju, iztūpumu, ievilkumu vai krūtsgala pārmaiņas).</li> <li>- Krūšu un limfmezglu palpācija, pārbaudot, vai nav veidojums vai palielināts limfmezgls vienā vai abās pusēs, ar paceltām un nolaistām rokām; palielināts limfmezgls zem vai virs atslēgas kaula vienā vai abās pusēs.</li> </ul>	<p><u>Radioloģiskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krūšu USG &lt;35 gadiem.</li> <li>- Mamogrāfija ≥35 gadiem.</li> <li>- Mamogrāfija &lt;35 gadiem, ja USG ir pozitīva atradne.</li> </ul>	<p><u>Pie ķirurga, kurš specializējies krūts slimību ārstēšanā:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAKUS</li> <li>- PSKUS</li> <li>- Daugavpils reģ. slimnīca</li> <li>- Liepājas reģ. slimnīca</li> <li>- Piejūras slimnīca</li> </ul>
<p><b>KUŅĪS</b> <b>Z03.116</b> Izmeklēšana iespējama kuņģa ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><u>Iespējamie simptomi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disfāģija.</li> <li>- ≥55 gadiem ir svara zudums un kāds no simptomiem: sāpes epigastrijā, t.sk. kombinācijā ar zemu hemoglobīna līmeni; GERS;</li> <li>- ≥55 gadiem ir kāds no simptomiem: dispepsija, t.sk., ja tā nepadodas ārstēšanai; trombocitoze, t.sk. kombinācijā ar šķēbināšanu, vemšanu, svara zudumu, GERS, dispepsiju vai sāpēm epigastrijā; šķēbināšana un vemšana, t.sk. kombinācijā ar svara zudumu, GERS, dispepsiju vai sāpēm epigastrijā.</li> <li>- Asiņu atvemšana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ādas apskate (novērtēt dzelti, kaheksiju, bālumu, turgoru).</li> <li>- Kakla, paduses, zem un virs atslēgas kaula limfmezglu palpācija.</li> <li>- Vēdera palpācija (novērtēt sāpīgumu, veidojumus).</li> <li>- Aknu palpācija (novērtēt aknu robežas, aknu malas virsmu, konsistenci, izmērus).</li> </ul>	<p><u>Laboratoriskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilna asins aina un EGĀ, izvērtējot anēmiju, leukocitozi, trombocitozi un EGĀ.</li> <li>- Bioķīmija – ferritīns, GGT, ALAT, SF, LDH, kreatinīns.</li> </ul> <p><u>Radioloģiskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RTG ar bāriju un/vai;</li> <li>- Gastroskopija ar biopsiju.</li> </ul>	<p><u>Pie ķirurga:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAKUS</li> <li>- PSKUS</li> <li>- Daugavpils reģ. slimnīca</li> <li>- Liepājas reģ. slimnīca</li> <li>- Piejūras slimnīca</li> </ul>

Diagnozes kods un nosaukums Simptomi	Kādi izmeklējumi jāveic apskates laikā?	Kādi izmeklējumi tiek nodrošināti jebkurā NVD līgumiestādē 10 darba dienu laikā virs kvotas?	Kur nosūta pacientu ar pozitīvas atradnes izmeklējumu rezultātiem?
<p><b>LŪPAS, MUTES DOBUMS, RĪKLES MUTES DAĻA</b></p> <p>Izmeklēšana iespējama:</p> <p><b>Z03.100</b> lūpas ļaundabīga audzēja dēļ;</p> <p><b>Z03.101</b> mēles saknes ļaundabīga audzēja dēļ;</p> <p><b>Z03.102</b> citu un neprecizētu mēles daļas ļaundabīga audzēja dēļ;</p> <p><b>Z03.103</b> smaganu ļaundabīga audzēja dēļ;</p> <p><b>Z03.104</b> mutes pamatnes ļaundabīga audzēja dēļ;</p> <p><b>Z03.105</b> aukslēju ļaundabīga audzēja dēļ;</p> <p><b>Z03.106</b> citu un neprecizētu mutes daļu ļaundabīga audzēja dēļ;</p> <p><b>Z03.107</b> pieauss dziedzera (<i>glandula parotis</i>) ļaundabīga audzēja dēļ;</p> <p><b>Z03.108</b> citu un neprecizētu lielo siekalu dziedzeru ļaundabīga audzēja dēļ;</p> <p><b>Z03.109</b> mandeles ļaundabīga audzēja dēļ;</p> <p><b>Z03.110</b> rīkles mutes daļas (<i>oropharynx</i>) ļaundabīga audzēja dēļ.</p> <p><u>Iespējamie simptomi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rīšanas traucējumi.</li> <li>- Ēšanas traucējumi (garšas, košļāšanas traucējumi).</li> <li>- Runas traucējumi, balss izmaiņas.</li> <li>- Svara zudums.</li> <li>- Veidojums un/vai izčūlojums vienā no lokalizācijām: mutes dobumā; deguna dobumā; aizdegunē; rīkles dobumā.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mutes dobuma apskate.</li> <li>- Deguna dobuma apskate.</li> <li>- Aizdegunes apskate.</li> <li>- Rīkles dobuma apskate.</li> <li>- Zobu un smaganu stāvokļa apskate.</li> <li>- Reģionālo limfmezglu palpācija.</li> </ul>	<p><u>Radioloģiskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RTG zobiem un/vai sejas-žokļa apvidum.</li> <li>- USG limfmezgliem, ja pacientam ar veidojumu ir taustāmi limfmezgli.</li> </ul>	<p><u>Pie otolaringologa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAKUS</li> <li>- PSKUS</li> <li>- Daugavpils reģ. slimnīca</li> <li>- Liepājas reģ. slimnīca</li> <li>- Piejūras slimnīca</li> </ul>
<p><b>NIERES</b></p> <p><b>Z03.164</b></p> <p>Izmeklēšana iespējama nierēs (atskaitot nierēs bļodiņas) ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><b>Z03.165</b></p> <p>Izmeklēšana iespējama nierēs bļodiņas ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><u>Iespējamie simptomi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ≥ 45 gadiem ir kāds no simptomiem: neizskaidrojama makrohematūrija bez konstatētas UCI; persistējoša makrohematūrija, t. sk. tās periodiska atkārtotāšanās pēc UCI izārstēšanas.</li> <li>- Sārta urīns.</li> <li>- Sāpes sānos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nieru apvidus palpācija un aplauvēšana.</li> <li>- Padušu un cirkšņu limfmezglu palpācija.</li> </ul>	<p><u>Laboratoriskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilna asins aina un EGĀ, izvērtējot anēmiju, leukocitozi, un EGĀ.</li> <li>- Bioķīmija - LDH, kreatinīns un GFĀ.</li> <li>- Urīna analīze - eritrocītu un baktēriju esamība, citoloģiskā izmeklēšana.</li> </ul> <p><u>Radioloģiskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vēdera dobuma USG.</li> <li>- Vēdera dobuma CT ar kontrastvielu, ja USG izmaiņas nekonstatē, bet saglabājas simptomi, sūdzības un ir pozitīva laboratoriska atradne.</li> </ul>	<p><u>Pie urologa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAKUS</li> <li>- PSKUS</li> <li>- Daugavpils reģ. slimnīca</li> <li>- Liepājas reģ. slimnīca</li> </ul>

Diagnozes kods un nosaukums Simptomi	Kādi izmeklējumi jāveic apskates laikā?	Kādi izmeklējumi tiek nodrošināti jebkurā NVD līgumiestādē 10 darba dienu laikā virs kvotas?	Kur nosūta pacientu ar pozitīvas atradnes izmeklējumu rezultātiem?
<p><b>OLNĪCAS</b> <b>Z03.156</b> Izmeklēšana iespējama olnīcu ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><u>Iespējamie simptomi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sāpes vēderā, pilnuma sajūta, vēdera pūšanās.</li> <li>- Vēdera apjoma palielināšanās bez svara palielinājuma.</li> <li>- Taustāms veidojums vēderā.</li> <li>- ≥50 gadiem ir kāds no simptomiem (biežāk par 12 x/mēn.): vēdera pūšanās; priekšlaikus sāta sajūtas iestāšanās un apetītes samazināšanās; sāpes vēderā vai iegurnī; biežāka urinēšana vai spiedoša vajadzība.</li> <li>- Neizskaidrojams svara zudums, nespēks, nogurums un vēdera izejas pārmaiņas.</li> <li>- Vismaz divām pirmās vai otrās pakāpes radniecēm ir bijis olnīcu vai krūts vēzis &lt;50 gadu vecumam.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vēdera lejas daļas un cirkšņu apvidus palpācija.</li> </ul>	<p><u>Laboratoriskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilna asins aina un EGĀ, izvērtējot anēmiju, leukocitozi un EGĀ.</li> <li>- Bioķīmija – α-fetoproteīns, SF, LDH, CA – 125.</li> </ul> <p><u>Radioloģiskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vēdera un iegurņa dobuma USG.</li> <li>- Vēdera un iegurņa dobuma CT, ja paaugstināts CA-125 un citos izmeklējumos ir pozitīva atradne.</li> </ul>	<p><u>Pie ginekologa vai onkoloģijas ginekologa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAKUS</li> <li>- PSKUS</li> <li>- Daugavpils reģ. slimnīca</li> <li>- Liepājas reģ. slimnīca</li> <li>- Piejūras slimnīca</li> </ul>
<p><b>PROSTATĀ</b> <b>Z03.161</b> Izmeklēšana iespējama prostatas ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><u>Iespējamie simptomi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ≥40 gadiem (ja ģimenes anamnēzē ir prostatas vēzis) un ≥45 ir urinācijas traucējumi: biežāka urinācija; niktūrija; strūklas pavājināšanās; spiedoša vajadzība urinēt; urīna retence; grūtības uzsākt urināciju; biežas UCI; Makrohematūrija.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitāli rektāla izmeklēšana (novērtēt, vai nav izmainīta prostata, tās forma, konsistence, lielums, sāpīgums vai virsma).</li> </ul>	<p><u>Laboratoriskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PSA un brīvā PSA koncentrācijas un dinamikas noteikšana.</li> </ul> <p><u>Radioloģiskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transrektāla USG ar biopsiju.</li> </ul>	<p><u>Pie urologa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAKUS</li> <li>- PSKUS</li> <li>- Daugavpils reģ. slimnīca</li> <li>- Liepājas reģ. slimnīca</li> </ul>
<p><b>RESNĀ, TAISNĀ ZARNA, TŪPLIS</b> <b>Z03.118</b> Izmeklēšana iespējama resnās zarnas ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><b>Z03.119</b> Izmeklēšana iespējama sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><b>Z03.120</b> Izmeklēšana iespējama taisnās zarnas ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><b>Z03.121</b> Izmeklēšana iespējama tūpļa (<i>anus</i>) un tūpļa kanāla (<i>canalis analis</i>) ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><u>Iespējamie simptomi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ≥ 40 gadiem ir svara zudums bez konstatēta iemesla un sāpes vēderā.</li> <li>- ≥ 50 gadiem ir neizskaidrojami asiņaini izdalījumi no taisnās zarnas.</li> <li>- ≥ 60 gadiem ir dzelzs deficīta anēmija un/vai vēdera izejas traucējumi.</li> <li>- ≤ 50 gadiem ir asiņaini izdalījumi no taisnās zarnas un viens no šiem simptomiem – sāpes vēderā, vēdera izejas traucējumi, svara zudums, dzelzs deficīta anēmija.</li> <li>- Taustāms veidojums vēderā vai taisnajā zarnā.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ādas apskate (novērtēt dzelti, turgoru, anēmiju).</li> <li>- Vēdera palpācija (novērtēt sāpīgumu, veidojumus).</li> <li>- Aknu palpācija (novērtēt aknu robežas, aknu malas virsmu, konsistenci, izmērus, sāpīgumu).</li> <li>- Cirkšņu limfmezglu palpācija.</li> <li>- Digitāli rektāla izmeklēšana, ja ir aizdomas par taisnās zarnas un/vai tūpļa un tūpļa kanāla veidojumu.</li> </ul>	<p><u>Laboratoriskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilna asins aina un EGĀ, izvērtējot anēmiju, leukocitozi un EGĀ.</li> <li>- Bioķīmija – ferritīns, ALAT, SF, LDH, kreatinīns.</li> <li>- Slēpto asiņu tests fecēs.</li> </ul> <p><u>Radioloģiskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rektoskopija ar biopsiju, ja ir taisnās zarnas un/vai tūpļa un/vai tūpļa kanāla veidojums.</li> <li>- RTG ar bāriju un/vai kolonskopija ar biopsiju, ja ir resnās zarnas veidojums.</li> </ul>	<p><u>Pie kirurga:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAKUS</li> <li>- PSKUS</li> <li>- Daugavpils reģ. slimnīca</li> <li>- Liepājas reģ. slimnīca</li> <li>- Piejūras slimnīca</li> </ul>

Diagnozes kods un nosaukums Simptomi	Kādi izmeklējumi jāveic apskates laikā?	Kādi izmeklējumi tiek nodrošināti jebkurā NVD līgumiestādē 10 darba dienu laikā virs kvotas?	Kur nosūta pacientu ar pozitīvas atradnes izmeklējumu rezultātiem?
<p><b>URĪNPŪSLIS</b> <b>Z03.167</b> Izmeklēšana iespējama urīnpūšļa ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><u>Iespējamie simptomi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ≥ 45 gadiem ir kāds no simptomiem: neizskaidrojama makrohematūrija bez konstatētas UCI; persistējoša vai periodiska makrohematūrija pēc UCI izārstēšanas.</li> <li>- ≥ 60 gadiem ir kāds no simptomiem: neizskaidrojama mikrohematūrija un dizūrija; leukocitoze.</li> <li>- Atkārtotas un biežas UCI vecumā ≥ 60 gadiem.</li> <li>- Pūšļa nepilnīgas iztukšošanās sajūta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ādas apskate (novērtēt kaheksiju, bālumu, turgoru).</li> <li>- Vēdera palpācija (novērtēt sāpīgumu, veidojumus).</li> <li>- Cirkšņu limfmezglu palpācija.</li> </ul>	<p><u>Laboratoriskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilna asins aina un EGĀ, izvērtējot anēmiju, leukocitozi.</li> <li>- Bioķīmija – feritīns, SF, LDH, kreatinīns, CRO.</li> <li>- Urīna analīze – leukocītu, eritocītu esamība, citoloģiskā izmeklēšana (atpisku vai audzēju šūnu esamība).</li> </ul> <p><u>Radioloģiskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vēdera un mazā iegurņa dobuma USG.</li> </ul> <p><u>Citi izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cistoskopija.</li> </ul>	<p><u>Pie urologa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAKUS</li> <li>- PSKUS</li> <li>- Daugavpils reģ. slimnīca</li> <li>- Liepājas reģ. slimnīca</li> </ul>
<p><b>VAIROGDZIEDZERIS</b> <b>Z03.173</b> Izmeklēšana iespējama vairogdziedzera ļaundabīga audzēja dēļ</p> <p><u>Iespējamie simptomi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balss izmaiņas.</li> <li>- Stridorozs, apgrūtināta elpošana.</li> <li>- Rīšanas grūtības.</li> <li>- Strauji augošs veidojums kaklā.</li> <li>- Palielināti kakla limfmezgli.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Noskaidrot, vai anamnēzē ir kāds no faktiem: kakla apstarojums bērnībā; Černobijas AES katastrofas upuris vai seku likvidācijas dalībnieks; vairogdziedzera vēzis I un II pakāpes radniekam.</li> <li>- Vairogdziedzera palpācija (novērtēt, vai nav cietāka konsistence jeb mazkustīgs veidojums).</li> <li>- Kakla limfmezglu palpācija.</li> </ul>	<p><u>Laboratoriskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TSH līmenis asinīs;</li> <li>- Tireoglobulīna līmenis asinīs, ja iepriekš veikta vairogdziedzera ķirurģija.</li> </ul> <p><u>Radioloģiskie izmeklējumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- USG, izvērtējot malignitātes risku – TIRADS.</li> <li>- Vairogdziedzera scintigrāfiju, ja TSH asinīs ↓ un USG ir atklāts mezgls.</li> </ul>	<p><u>Pie endokrinologa vai ķirurga:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAKUS</li> <li>- PSKUS</li> <li>- Daugavpils reģ. slimnīca</li> <li>- Liepājas reģ. slimnīca</li> </ul>

Diagnozes kods un nosaukums/Simptomi	Kādi izmeklējumi jāveic apskates laikā?	Kādi izmeklējumi tiek nodrošināti jebkurā NVD līgumiestādē 10 darba dienu laikā vīrs kvotas?	Kur nosūta pacientu ar pozitīvas atradnes izmeklējumu rezultātiem?
--------------------------------------	---	--	--

<b>CITAS LOKALIZĀCIJAS, KURĀM NAV NOTEIKTA IZMEKLĒŠANAS KĀRTĪBA</b>	- Konstatē atbilstošas sūdzības vai simptomu;	<u>Laboratoriskie izmeklējumi:</u>	<u>Pie atbilstoša speciālista vai onkologa ķīmijterapieta:</u> - RAKUS - PSKUS - Daugavpils reģ. slimnīca - Liepājas reģ. slimnīca - Piejūras slimnīca.
	- Atbilstoši medicīniskajām indikācijām veic mērķtiecīgas, pamatotas pārbaudes.	- Atbilstoši medicīniskajām indikācijām veic, mērķtiecīgus, pamatotus laboratoriskos izmeklējumus.	
		<u>Radioloģiskie izmeklējumi:</u>	
		- Atbilstoši medicīniskajām indikācijām veic, mērķtiecīgus, pamatotus vizuālās diagnostikas izmeklējumus.	
		<u>Citi izmeklējumi:</u>	
		- Atbilstoši medicīniskajām indikācijām veic, mērķtiecīgus, pamatotus cita veida izmeklējumus.	

<b>LŪPU, MUTES DOBUMA UN RĪKLES ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI</b>		<b>Z03.148</b>	Izmeklēšana iespējama retroperitoneālo audu un vēderplēves ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.177</b>	Izmeklēšana iespējama sekundāra un neprecizēta limfmezglu ļaundabīga audzēja dēļ
<b>Z03.111</b>	Izmeklēšana iespējama aizdegunes ( <i>nasopharynx</i> ) ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.149</b>	Izmeklēšana iespējama pārējo saistaudu un mīksto audu ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.178</b>	Izmeklēšana iespējama sekundāra elpošanas un gremošanas orgāna ļaundabīga audzēja dēļ
<b>Z03.112</b>	Izmeklēšana iespējama bumbierveida dobuma ( <i>sinus/ recessus pyriformis</i> ) ļaundabīga audzēja dēļ	<b>SIEVIEŠU DZIMUMORGĀNU ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI</b>		<b>Z03.179</b>	Izmeklēšana iespējama sekundāra cita un neprecizētas lokalizācijas ļaundabīga audzēja dēļ
<b>Z03.113</b>	Izmeklēšana iespējama rīkles apakšējās jeb balsenes daļas ( <i>hypopharynx</i> ) ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.151</b>	Izmeklēšana iespējama sieviešu ārējo dzimumorgānu (vulva) ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.180</b>	Izmeklēšana iespējama ļaundabīga audzēja dēļ, bez norādes par lokalizāciju
<b>Z03.114</b>	Izmeklēšana iespējama lūpu, mutes dobuma un rīkles (ar citu neprecizētu lokalizāciju) ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.152</b>	Izmeklēšana iespējama maksts ļaundabīga audzēja dēļ	<b>LIMFOĪDO, ASINSRADES UN TIEM RADNIECĪGU AUDU ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI</b>	
<b>GREMOŠANAS ORGĀNU ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI</b>		<b>Z03.153</b>	Izmeklēšana iespējama dzemdes kakla ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.182</b>	Izmeklēšana iespējamas folikulāras limfomas dēļ
<b>Z03.115</b>	Izmeklēšana iespējama barības vada ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.157</b>	Izmeklēšana iespējama cita un neprecizēta sieviešu dzimumorgāna ļaundabīga audzēja dēļ		
<b>Z03.117</b>	Izmeklēšana iespējama tievās zarnas ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.158</b>	Izmeklēšana iespējama placentas ļaundabīga audzēja dēļ		
<b>Z03.126</b>	Izmeklēšana iespējama cita un neprecīzi definēta gremošanas orgāna ļaundabīga audzēja dēļ	<b>VĪRIEŠU DZIMUMORGĀNU ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI</b>		<b>Z03.184</b>	Izmeklēšana iespējamas nobriedušu T/NK šūnu limfomas dēļ
<b>ELPOŠANAS UN KRŪŠU DOBUMA ORGĀNU ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI</b>		<b>Z03.160</b>	Izmeklēšana iespējama dzimumlocekļa ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.185</b>	Izmeklēšana iespējama cita un neprecizēta nehodžkina limfomas veida dēļ
<b>Z03.130</b>	Izmeklēšana iespējama deguna dobuma un vidusauss ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.162</b>	Izmeklēšana iespējama sēklinieka ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.186</b>	Izmeklēšana iespējama cita precizēta T/NK šūnu limfomas dēļ
<b>Z03.131</b>	Izmeklēšana iespējama deguna blakusdobumu ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.163</b>	Izmeklēšana cita un neprecizēta vīriešu dzimumorgāna ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.188</b>	Izmeklēšana iespējama ļaundabīgas imūnproliferatīvas slimības dēļ
<b>Z03.132</b>	Izmeklēšana iespējama balsenes ļaundabīga audzēja dēļ	<b>URĪNIZVADORGĀNU ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI</b>		<b>Z03.190</b>	Izmeklēšana iespējamas multiplās mielomas un plazmas šūnu ļaundabīga audzēja dēļ
<b>Z03.133</b>	Izmeklēšana iespējama trahejas ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.166</b>	Izmeklēšana iespējama urīnvauda ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.191</b>	Izmeklēšana iespējamas limfoleikozes dēļ
<b>Z03.137</b>	Izmeklēšana iespējama aizkrūtes dziedzera ( <i>thymus</i> ) ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.168</b>	Izmeklēšana iespējama cita un neprecizēta urīnizvadorgāna ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.192</b>	Izmeklēšana iespējamas mieloleikozes dēļ
<b>KAULU UN LOCĪTAVU SKRIMŠĻU ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI</b>		<b>ACS ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI</b>		<b>Z03.193</b>	Izmeklēšana iespējamas monocitāras leikocitozes dēļ
<b>Z03.140</b>	Izmeklēšana iespējama ekstremitāšu kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.169</b>	Izmeklēšana iespējama acs un acs palīgorgāna ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.194</b>	Izmeklēšana iespējamas citas precizētas leikozes dēļ
<b>Z03.141</b>	Izmeklēšana iespējama cita un neprecizēta kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīga audzēja dēļ	<b>CITU ENDOKRĪNO DZIEDZERU ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI</b>		<b>Z03.195</b>	Izmeklēšana iespējamas neprecizētas šūnu leikozes dēļ
<b>MEZOTELIĀLO UN MĪKSTO AUDU ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI</b>		<b>Z03.174</b>	Izmeklēšana iespējama virsnieru ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.196</b>	Izmeklēšana iespējama cita un neprecizēta limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīga audzēja dēļ
<b>Z03.145</b>	Izmeklēšana iespējama mezoteliomas ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.175</b>	Izmeklēšana iespējama pārējo endokrīno dziedzeru un radniecīgas struktūras ļaundabīga audzēja dēļ	<b>NEATKARĪGI (PRIMĀRI) MULTIPLI ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI</b>	
<b>Z03.146</b>	Izmeklēšana iespējama Kapoši (Kaposi) ļaundabīga audzēja dēļ	<b>NEPRECĪZI APZĪMĒTI, SEKUNDĀRI UN NELOKALIZĒTI ĻAUNDABĪGI AUDZĒJI</b>		<b>Z03.197</b>	Izmeklēšana iespējama neatkarīgi (primāri) multipla ļaundabīga audzēja dēļ
<b>Z03.147</b>	Izmeklēšana iespējama perifērisko nervu un veģetatīvās (autonomās) nervu sistēmas ļaundabīga audzēja dēļ	<b>Z03.176</b>	Izmeklēšana iespējama cita un neprecīzi apzīmētas lokalizācijas ļaundabīga audzēja dēļ		



**Saziņai ar specializētajām slimnīcām (pacientu uz speciālistu konsultāciju piesaka ģimenes ārsta prakse\*)**

\* Krūts, dzemdes ķermeņa un olnīcu vēža gadījumā saziņu var veikt arī ginekologs, dzemdību speciālists

Slimnīca	Tālruna numurs	Darba laiks
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes klīnika (RAKUS)	67 042 264	8:00 - 18:00
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca (PSKUS)	67 095 393, 25 650 310	8:00 - 19:00
Daugavpils reģionālā slimnīca	65 422 419	7:00 - 19:00
Liepājas reģionālā slimnīca	26 653 224	10:00 - 15:00
Piejūras slimnīca	63 422 968	8:00 -17:00 (Pk. līdz 16:00)

**Papildu informācija par pacientu nosūtīšanu un “zaļo koridoru”**

Nacionālais veselības dienests	Tālruna numurs	E-pasts
Rīgas teritoriālā nodaļa	67 201 282	riga@vmnvd.gov.lv
Zemgales teritoriālā nodaļa	63 027 249	zemgale@vmnvd.gov.lv
Kurzemes teritoriālā nodaļa	63 323 471	kurzeme@vmnvd.gov.lv
Vidzemes teritoriālā nodaļa	64 772 301	vidzeme@vmnvd.gov.lv
Latgales teritoriālā nodaļa	65 422 236	latgale@vmnvd.gov.lv

**SVARĪGI!** Aicinām informēt pacientu, ka, pierakstoties ārstniecības iestādē diagnostiskajiem izmeklējumiem, nepieciešams atsaukties uz ģimenes ārsta nosūtījumā uzrādīto pamatslimības diagnozes kodu, jo tikai šī informācija nodrošinās, ka pacientam veselības aprūpes pakalpojums tiks nodrošināts paātrinātā kārtībā.