

BALSTVAKCINĀCIJA LATVIJĀ NO 2021.GADA 9.NOVEMBRA

BALSTVAKCINĀCIJA = IMŪNAIZSARDZĪBAS STIPRINĀŠANAI



Stingra rekomendācija
Vēlams
Nav nepieciešams



Balstvakcinācija NAV nepieciešama, ja:
pirms, starp vai pēc pirmreizējās vakcinācijas
kursa ir bijis pozitīvs Covid-19 tests.

Vecuma grupa	Vakcīnas veids	Periods pēc vakcinācijas kursa pabeigšanas	
18+	Janssen Johnson & Johnson	8 - 12 nedēļas	
18 - 29	Jebkurš vakcīnas veids, izņemot "Janssen"		<ul style="list-style-type: none">- Būtiskas blakus slimības- Hroniskas slimības- Ilgstoša saskare ar Covid-19 pacientiem vai nevakcinātiem cilvēkiem
30 - 64	Comirnaty Pfizer-BionTech Vaxzevria AstraZeneca Jauktas vakcīnas Spikevax Moderna	6 mēneši 6 - 8 mēneši	<ul style="list-style-type: none">- Hroniskas slimības- Ilgstoša saskare ar Covid-19 pacientiem vai nevakcinātiem cilvēkiem
65+	Comirnaty Pfizer-BionTech Vaxzevria AstraZeneca Jauktas vakcīnas Spikevax Moderna	6 mēneši 6 - 8 mēneši	

Balstvakcināciju veic ar Spikevax vai Comirnaty vakcīnu.
Tiem, kurus pirmreizēji vakcinēja ar Vaxzevria, pieļaujama arī Vaxzevria lietošana.


Vairāk informācijas pie ģimenes ārsta

manavakcina.lv

vai



8989



Nacionālais veselības dienests