


KAD SAŅEMT BALSTVAKCĪNU PRET COVID-19?



Piesakies manavakcina.lv, 8989 vai pie sava ģimenes ārsta

ĪPAŠI REKOMENDĒTA: RISKĀ GRUPĀM, PERSONĀM 40+ UN TIEM, KAS PIRMREIZĒJO VAKCINĀCIJU SAŅĒMUŠI PAVASARĪ VAI VASARAS SAKUMĀ

JA PRIMĀRAJĀ KURSĀ SAŅEMTA JANSSEN VAKCĪNA

2 mēn. pēc
1. potes

JA PRIMĀRAJĀ KURSĀ SAŅEMTA VAXZEVRIA,
COMIRNATY VAI SPIKEVAX VAKCĪNA

3 mēn. pēc
2. potes

JA PĀRSLIMOTS COVID-19 + SAŅEMTA VIENA
VAKCĪNAS DEVA

3 mēn. pēc 1.
potes vai
pārslimošanas

JA PĀRSLIMOTS COVID-19 + SAŅEMTAS DIVAS
VAKCĪNAS DEVAS

6 mēn. pēc
potes vai
pārslimošanas

PERSONĀM AR NOVĀJINĀTU IMUNITĀTI

3 mēn. pēc
3. potes

**Pusaudžiem no 12 līdz 17 gadiem,
kas veikuši primāro vakcināciju ar Comirnaty***

* ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc otrās devas saņemšanas;

* Balstvakcinācija nav nepieciešama, ja pārslimots Covid-19;

* IVP rekomendācija - veseliem bērniem un jauniešiem Covid-19 balstvakcinācija šobrīd nav nepieciešama;

* Var saņemt balstvakcīnu formālu (piemēram, ieceļošanai citās valstīs) iemeslu dēļ.



Nacionālais veselības
dienests