



Nacionālais veselības
dienests

Semaglutidum izrakstīšana ar valsts kompensāciju

Inga Brokere, Kontroles un uzraudzības departamenta direktore

28.05.2026



Semaglutidum saturošie medikamenti (ZVA, Latvijas Zāļu reģistrs - [Latvijas Zāļu reģistrs](#))

Ozempic

- Ozempic 0,25 mg šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē
- Ozempic 0,5 mg šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē
- Ozempic 1 mg šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē
- **Valsts kompensēts, KZS izrakstīšanas nosacījumi**
- **Ozempic 2 mg šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē (no 01.06.2026)**

Rybelsus

- Rybelsus 1,5 mg tabletes
- Rybelsus 3 mg tabletes (tiks svītroti no KZS no 01.07.2026)
- Rybelsus 4 mg tabletes
- Rybelsus 7 mg tabletes (tiks svītroti no KZS no 01.07.2026)
- Rybelsus 9 mg tabletes
- Rybelsus 14 mg tabletes (tiks svītroti no KZS no 01.07.2026)
- **Valsts kompensēts, KZS izrakstīšanas nosacījumi**
- **Rybelsus 25 mg tabletes**
- **Rybelsus 50 mg tabletes**

Wegovy

- **Wegovy 0,25 mg šķīdums vai FlexTouch šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē**
- **Wegovy 0,5 mg šķīdums vai FlexTouch šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē**
- **Wegovy 1 mg šķīdums vai FlexTouch šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē**
- **Wegovy 1,7 mg šķīdums vai FlexTouch šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē**
- **Wegovy 2,4 mg šķīdums vai FlexTouch šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē**
- **NAV VALSTS KOMPENSĒTS**



Nacionālais veselības
dienests

Ozempic valsts kompensācijas nosacījumi

Atbilstoši Zāļu aprakstam ([Ozempic, INN-semaglutide](#)) «**Ozempic ir indicēts nepietiekami kontrolēta 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai pieaugušajiem, papildus diētai un fiziskām aktivitātēm**»

Medikamenta izrakstīšana ([INN Dg uz 01.03.2026..xlsx](#)):

1. Endokrinologa kompetencē.

Pacientiem ar ķermeņa masas indeksu ≥ 30 kg/m² kombinācijā ar Metforminum, ja trīskāršā terapija, kas satur Metforminum, DPP4 inhibitorus, Pioglitazonum, SGLT2 inhibitorus, nenodrošina pietiekamu glikēmijas kontroli (HbA1c<7%).

2. Endokrinologa vai kardiologa kompetencē.

Pacientiem ar pierādītu kardiovaskulāru slimību anamnēzē, kombinācijā ar/bez Metforminum un/vai SGLT2 inhibitoriem grupas preparātiem, ja terapija, kas satur Metforminum, SGLT2 inhibitorus, nenodrošina pietiekamu glikēmijas kontroli (HbA1c<7%).

Nelieto kā "tikai svara zāles" bez indikācijas!



Nacionālais veselības
dienests

Ozempic valsts kompensācijas nosacījumi (papildināti)

Atbilstoši Zāļu aprakstam ([Ozempic, INN-semaglutide](#)) «**Ozempic ir indicēts nepietiekami kontrolēta 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai pieaugušajiem, papildus diētai un fiziskām aktivitātēm**»

Medikamenta izrakstīšana ([Kompensējamo zāļu saraksti | Nacionālais veselības dienests](#)) ar **izmaiņām no 01.05.2026:**

1. Endokrinologa **vai ģimenes ārsta kompetencē.**

Pacientiem ar ķermeņa masas indeksu $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ kombinācijā ar Metforminum, ja trīskāršā terapija, kas satur Metforminum, DPP4 inhibitorus, Pioglitazonum, SGLT2 inhibitorus, nenodrošina pietiekamu glikēmijas kontroli ($\text{HbA1c} < 7\%$).

2. Endokrinologa vai kardiologa, **vai ģimenes ārsta kompetencē.**

Pacientiem ar pierādītu kardiovaskulāru slimību anamnēzē, kombinācijā ar/bez Metforminum un/vai SGLT2 inhibitoriem grupas preparātiem, ja terapija, kas satur Metforminum, SGLT2 inhibitorus, nenodrošina pietiekamu glikēmijas kontroli ($\text{HbA1c} < 7\%$).

Nelieto kā "tikai svara zāles" bez indikācijas!

Noteikti arī gadījumi, kad terapija jāpārtrauc:



Nacionālais veselības
dienests

Ozempic, devas un lietošanas veids

Atbilstoši Zāļu aprakstam ([Ozempic, INN-semaglutide](#)):

- 1. Sājumdeva ir 0,25 mg semaglutīda vienu reizi nedēļā.*
- 2. Pēc 4 nedēļām deva jāpalielina līdz 0,5 mg vienu reizi nedēļā.*
- 3. Pēc vismaz 4 nedēļām, kad lietota deva 0,5 mg reizi nedēļā, devu var palielināt līdz 1 mg vienu reizi nedēļā, lai turpinātu uzlabot glikēmisko kontroli.*
- 4. Pēc vismaz 4 nedēļām, kad lietota deva 1 mg reizi nedēļā, devu var palielināt līdz 2 mg vienu reizi nedēļā, lai turpinātu uzlabot glikēmisko kontroli.*

*Semaglutīds 0,25 mg nav uzturošā deva. **Nav ieteicams lietot devu lielāku par 2 mg vienu reizi nedēļā.***



Nacionālais veselības
dienests

Ozempic valsts kompensācijas nosacījumi

Terapija jāpārtrauc, ja:

1) pacientam ir nepieciešams uzsākt terapiju ar Insulinum, izņemot pacientus ar ķermeņa masas indeksu $> 40 \text{ kg/m}^2$,

2) 6 mēnešu laikā netiek sasniegts HbA1c samazinājums vismaz par 1% un/vai svara samazinājums vismaz par 3%.

Nelieto kā “tikai svara zāles” bez indikācijas!



Nacionālais veselības
dienests

Ozempic valsts kompensēts apjoms

	2023	2024	2025
Valsts apmaksātā summa, EUR	2 685 458.44	3 517 076.35	4 424 040.64
Iepakojumu skaits	31 903	42 169	58 239
Recepšu skaits	15 763	23 514	25 175
Pacientu skaits	3 300	4 158	6 012



Nacionālais veselības
dienests

Ozempic, 2024.-2025.gads, atprečotais apjoms pacientiem, kuriem gadā vairāk par 20 iepakojumiem

Receptes atprečošanas gads	2024	2025
Unikālais ārstniecības iestāžu skaits	180	203
Unikālais ārstu skaits	250	285
<i>t.sk. PVA</i>	201	234
	80%	82%
<i>t.sk. SAVA (endokrinologs, internists)</i>	49	51
Unikālais pacientu skaits	221	241
<i>t.sk. PVA</i>	177	205
	80%	85%
<i>t.sk. SAVA (endokrinologs)</i>	130	134
Atprečoto iepakojumu skaits	4 233	5 692
<i>t.sk. PVA</i>	2817	3969
	67%	70%
Vidējais iepakojumu skaits uz pacientu	19.2	23.6
<i>t.sk. PVA</i>	15.9	19.4
<i>t.sk. SAVA (endokrinologs)</i>	10.4	12.7
Valsts kompensētā summa, EUR	352 894.40	433 019.32
Vidējā valsts kompensētā summa uz pacientu, EUR	1596.81	1796.76
<i>t.sk. PVA</i>	1326.18	1472.87
<i>t.sk. SAVA (endokrinologs)</i>	869.09	969.68
Lielākais iepakojumu skaits uz vienu pacientu	99	210

Secinājumi:

- gan pacientu skaits, gan Ozempic atprečotais apjomam, ko ģimenes ārsti izrakstījuši vairāk nekā pieļaujams, ir tendence pieaugt.
- Identificēti 2 ĢĀP, kur atsevišķiem pacientiem atprečots kritiski liels iepakojumu skaits – uzsāktas pārbaudes.
- Veikts izvērtējums turpmākas uzraudzības plānošanai



Nacionālais veselības dienests

Divu ārstu (ar lielākajām valsts izmaksām un lielāko iepakojumu skaitu uz vienu pacientu (virs 100) 2024.-2025.gadā) pacientiem izrakstītās receptes ar Ozempic un Rybelsus periodā 2024.-2025.gads

Ārstniecības iestāde	Pacients	Vai pacients ir CD reģistrā	Ozempic						Rybelsus			Kopā (konkrēto) ĢĀP izrakstītais Ozempic un Rybelsus			Kopā visu ārstu izrakstītais Semaglutidum (Ozempic; Rybelsus)		
			Recepšu skaits	Atprečoto iepakojumu skaits	Valsts kompensētā summa, EUR	Vai pacientam ambulatorajos talonos ir diagnoze E10, E11, E13?	Vai pacientam ir ambulatorais talons pie kardiologa vai endokrinologa?	Pacientam citu ārstu izrakstītās receptes ar Ozempic	Recepšu skaits	Atprečoto iepakojumu skaits	Valsts kompensētā summa, EUR	Recepšu skaits	Atprečoto iepakojumu skaits	Valsts kompensētā summa, EUR	Recepšu skaits	Atprečoto iepakojumu skaits	Valsts kompensētā summa, EUR
ĢĀP 1	Pacients 1	Nav	29	46	3 664.07	nav	nav					29	46	3 664.07	29	46	3 664.07
ĢĀP 1	Pacients 2	Nav	64	171	13 331.19	ir	ir		20	37	3 550.01	84	208	16 881.20	84	208	16 881.20
ĢĀP 1	Pacients 3	Nav	22	37	2 935.29	ir	nav					22	37	2 935.29	22	37	2 935.29
ĢĀP 1	Pacients 4	Nav	14	40	3 165.30	ir	ir					14	40	3 165.30	14	40	3 165.30
ĢĀP 1	Pacients 5	Nav	8	24	1 896.12	ir	ir	6 receptes (atpreč. 16 iepakojumi) izrakstījis endonkrinologs; 1 recepte (atpreč. 3 iepakojumi) izrakstījis cits ĢĀ	1	3	280.02	9	27	2 176.14	16	46	3 718.55
ĢĀP 1	Pacients 6	Nav	18	51	4 078.63	ir	ir					18	51	4 078.63	18	51	4 078.63
ĢĀP 1	Pacients 7	IR	11	32	2 539.40	ir	ir	4 receptes (atpreč. 6 iepakojumi) izrakstījis endokrinologs				11	32	2 539.40	15	38	3 017.03
ĢĀP 2	Pacients 8	Nav	9	27	2 058.21	ir	ir	2 receptes (atpreč. 6 iepakojumi) izrakstījis endokrinologs				9	27	2 058.21	11	33	2 515.59
ĢĀP 2	Pacients 9	nav	98	309	24 308.20	ir	ir					98	309	24 308.20	98	309	24 308.20
Kopā			273	737	57 976.41				21	40	3 830.03	294	777	61 806.44	307	808	64 283.86



Nacionālais veselības
dienests

Atprečotais Ozempic apjoms pacientam 2025.gadā

Pacients	Ārsta specialitātes kods	Izrakst_medik_nos	Izrakst_medik_ID	Diagnozes kods	Izsniegt_medik_nos	Izsniegt_medik_ID	Atprečošanas datums (Month)	Atprečošanas datums	Iepakojumu skaits	Recepšu skaits	Terit_nod_apmaksajama_summa
Pacients	P02	Ozempic	EU/1/17/1251/005	E11.5	Ozempic	EU/1/17/1251/005	maijs	19.05.2025	3	1	227.94
							jūn	05.06.2025	4	1	303.92
							jūl	09.07.2025	3	1	227.94
								30.07.2025	3	1	227.94
							sept	23.09.2025	3	1	227.94
							nov	05.11.2025	2	1	151.96
								15.11.2025	3	1	227.94
							dec	05.12.2025	6	2	455.88
	P58	Ozempic	EU/1/17/1251/005	E11.5	Ozempic	EU/1/17/1251/005	apr	01.04.2025	3	1	227.94
							jūn	26.06.2025	3	1	227.94
Kopā pacientam									33	11	2507.34



Nacionālais veselības
dienests

Uzraudzības plānošana pacientiem, kuriem 2024.- 2025.gadā atprečotais apjoms pacientiem gadā vairāk par 20 iepakojumiem (n=233)



Nacionālais veselības
dienests

Pacientu īpatsvara sadalījums pēc izrakstītāja specialitātes

izrakstītāja specialitātes precizējums	Unikālais pacientu skaits	Īpatsvars, %
ĢĀP ā.p.	73	31.3%
ĢĀP/SAVA (endokrinologs)	132	56.7%
endokrinologs	28	12.0%
Kopā:	233	



Nacionālais veselības
dienests

Izvērtējuma rezultāti

- Kopējais pacientu skaits 233:
 - 125 pacienti no 119 ģimenes ārstiem ar 16 un vairāk atprečotiem Ozempic iepakojumiem gadā;
 - ~ 10% ģimenes ārstu nav ievērojuši KZ izrakstīšanas nosacījumus;
 - Nepieciešama mērķēta uzraudzība / skaidrojoši pasākumi



Izvērtējuma rezultāti

29% pacientu 2 gadu laikā nav bijuši valsts apmaksātas endokrinologu konsultācija:

- dažiem pacientiem bija tikai kardiologa konsultācijas;
- Neatbilst Ozempic terapijas uzraudzības principiem;
- Paaugstināts klīniskā un finanšu riska profils,

99% gadījumu UD pacientiem norādīta kādas no DG E10; E11; E13, t.sk. 8 pacientiem tikai kā blakus diagnoze;



Izvērtējuma rezultāti

12% pacientu (n=28) nav CD reģistrā;

- Administratīva vai datos balstīta neatbilstība;
- Ietekme uz uzraudzību un datu kvalitāti;
- Nepieciešama datu sakārtošana

15% (n=34) pacientiem papildus izrakstīts arī Rybelsus

- Iespējama terapijas dublēšanās;
- Nepieciešams izvērtēt terapijas maiņas indikācijas;
- Potenciāls neatbilstību risks kompensācijas nosacījumiem



Nacionālais veselības
dienests

Noslēgumā

👉 Ozempic ir efektīvs, bet strukturēti lietojams medikaments

👉 ģimenes ārsta un endokrinologa loma ir:

- pareizi atlasīt pacientu,
- sekot efektam,
- savlaicīgi koriģēt terapiju.

Galvenais – nevis tikai izrakstīt, bet aktīvi uzraudzīt



Nacionālais veselības
dienests

PRIORITĀRIE IETEIKUMI UN TURPMĀKAS DARBĪBAS

- veikt mērķētu uzraudzību ārstiem ar augstu Ozempic izrakstīšanas intensitāti
- Pastiprināt KZ izrakstīšanas nosacījumu kontroli un skaidrojošo komunikāciju
- Stiprināt endokrinologa iesaisti Ozempic terapijas uzraudzībā
- Veikt CD reģistra datu aktualizāciju un kvalitātes kontroli
- Izvērtēt paralēlas GLP-1 terapijas gadījumus



Nacionālais veselības
dienests

Paldies par uzmanību!