

Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības

Mācība par cukura diabēta veidu, komplikāciju, hipoglikēmijas un hiperosmolāra stāvokļa kodēšanu.

- E10–E14
- Komplikāciju kodi
- Hipoglikēmija
- Insulīna blakne
- Saindēšanās
- HHS

Prezentācijas fokuss

1

Kā izvēlēties cukura diabēta kategoriju

2

Kā atšķirt diabēta komplikāciju no blakus stāvokļa

3

Kā kodēt hipoglikēmiju un komu

4

Kā nošķirt insulīna blakni no pārdozēšanas

Cukura diabēta kategoriju nosaka slimības veids

Insulīna lietošana pati par sevi nemaina 2. tipa cukura diabētu uz 1. tipu.

E10._

- 1. tipa cukura diabēts

E11._

- 2. tipa diabēts arī tad, ja lieto insulīnu

E12._

- diabēts nepietiekama uztura dēļ

E13._ / E14._

- cits precizēts / pagaidām neprecizēts diabēts

E__7 lieto tikai tad, ja komplikācijas nevar precizēt

**“Multiplas komplikācijas” nav īsceļš, ja konkrētās
komplikācijas ir zināmas.**

Diabētiska gangrēna un kāju čūla jau ietilpst E__.5

E__.5 gadījumā gangrēnu vai kāju čūlu papildus nekodē.

Kods jau ietver perifēriskās asinsrites komplikāciju un tās izpausmi.

Sirds komplikācijas diabēta gadījumā

Ja miokarda infarkts, sirds mazspēja vai stenokardija dokumentēta kā diabēta komplikācija, diabētu norāda sekundāri ar E__6.

Ko atcerēties

- primārā diagnoze atspoguļo akūto ārstējamo sirds stāvokli

Hipoglikēmija un hipoglikēmiska koma nav viena kodēšanas situācija

Bez komas primāri kodē hipoglikēmiju; komas gadījumā primāri kodē diabētu ar komu.

Hipoglikēmija bez komas

- E16._ primāri
- E__.9 sekundāri

Hipoglikēmiska koma

- E__.0 primāri
- E16._ sekundāri

Pareizi lietots insulīns vai pārāk liela deva?

Lietošanas veids nosaka, vai reakcija ir blakne vai saindēšanās.

Pareiza lietošana

- insulīna blakne
 - var būt izpausme ar kodu R__
- Y42.3

Pārāk liela deva

- saindēšanās
- T36–T65 primāri
- Y42.3

Hiperglikēmija nav automātiski diabēta komplikācija

Hiperglikēmiju un nekontrolētu diabētu kodē ar E__.9 bez komplikācijām; hiperglikēmiju papildus nekodē.

Hiperglikēmisks hiperosmolārs stāvoklis

HHS kodu secību nosaka tas, vai pacientam ir koma.

HHS ar komu

- E___.0
- E87.0

HHS bez komas

- E___.6
- E87.0

Diabētiska nefropātija un retinopātija

Katru precizēto diabēta komplikāciju kodē ar savu diabēta kodu un zvaigznītes izpausmes kodu.

Diabēts

- E__.2 vai E__.3



Izpausme

- N08.3* vai H36.0*

Vienam pacientam var būt vairāki precizēti diabēta kodi

Nefropātija, perifērās asinsrites komplikācija un acu komplikācija nav jāsapludina vienā E__.7 kodā.

Ko atcerēties

- norāda katru dokumentēto komplikāciju atsevišķi

Pārdozēšanas piemērs veido pilnu cēloņu ķēdi

Netīšā insulīna pārdozēšanā jāatspoguļo viela, ārējais apstāklis, diabēts ar komu un hipoglikēmija.

Ko atcerēties - saindēšanās

- T38.3
- X44

Turpinājums - pārējās sekundārās diagnozes

- E___.0
- E16.2

Noslēgums

Cukura diabēta kodējumā vispirms nosaka tipu, pēc tam — precīzo komplikāciju un tās cēloni.