

Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods

Mācība par dzemdību, abortu, mātes un jaundzimušā epizožu robežām.

- Dzemdības
- Dzemdību iznākums
- Jaundzimušais
- Aborti
- O26 un O99
- Robežgadījumi

Prezentācijas fokuss

1

Kā nošķirt dzemdību pamat kodu no komplikācijas

2

Kā noteikt mātes un jaundzimušā epizodes robežu

3

Kā atšķirt abortu un pārtraukšanas scenārijus

4

Kā izvēlēties O26, O99 vai ar grūtniecību nesaistītu diagnozi

XV nodaļā vispirms nosaka epizodes pamatnotikumu

**Dzemdības, pārtraukta grūtniecība un ar grūtniecību saistīts stāvoklis
nav savstarpēji aizvietošanas kodēšanas situācijas.**

Dzemdību kods un dzemdību komplikācija

Dzemdības vienmēr kodē ar O80–O84; O60–O70 norāda komplikācijas sekundāri.

O80–O84

- dzemdību pamatkods
- primārā diagnoze

O60–O70

- dzemdību darbība un komplikācijas
- sekundārā diagnoze

Z37._ pievieno mātes dzemdību epizodei

Dzemdību iznākumu vienmēr norāda sekundāri mātes epizodē.

Z37._ precizē dzīvi un nedzīvi dzimušo skaitu.

Z37._ nelieto spontāna aborta un medicīniskas grūtniecības pārtraukšanas gadījumā

Līdz 24. gestācijas nedēļai Z37._ nepievieno, ja epizode klasificēta kā aborts vai grūtniecības pārtraukšana.

Vesels un slims jaundzimušais

Vesels jaundzimušais paliek mātes epizodē; ārpus rutīnas ārstēšana rada atsevišķu jaundzimušā epizodi.

Vesels jaundzimušais

atsevišķu epizodi neveido
ietilpst mātes epizodē

Ārpus rutīnas aprūpe

izmeklējumi, manipulācijas vai ārstēšana
veido atsevišķu epizodi

Ektopiska grūtniecība un spontāns aborts

O00–O03 apraksta pārtraukto grūtniecību; O08._ papildina ar komplikācijām.

Pamatnotikums

O00–O03



Komplikācija

O08._ sekundāri

Pilnīgs un nepilnīgs aborts

Koda ceturto zīmi nosaka tas, vai grūtniecības audi pilnībā izvadīti.

Pilnīgs aborts

embrijs vai auglis, placenta un apvalki pilnībā izvadīti

Nepilnīgs aborts

daļa grūtniecības audu paliek dzemdes dobumā

Medicīnisku abortu līdz 12. nedēļai kodē ar O04._

**O04._ lieto arī tad, ja paciente abortu sagaida mājās vai tas
notiek stacionārā**

22.–24. nedēļas robežgadījums - medicīnisku iemeslu dēļ veikta grūtniecības pārtraukšana

Šajā periodā kodēšanu nosaka augļa svars.

Vairāk par 500 g

kodē kā dzemdības O80–O84

500 g vai mazāk

kodē ar O04._

No 22. gestācijas nedēļas kodē dzemdības

Sākot ar 24. nedēļu lieto O80–O84 un papildus Z37._.

Nenoticis aborts un spontāns aborts

O02.1 lieto tikai bez asiņošanas un bez grūtniecības audu izdalīšanās.

O02.1 Nenoticis aborts

nav dzīvības pazīmju
nav asiņošanas
audi nav sākuši izdalīties

O03._ Spontāns aborts

auglis ar dzīvības pazīmēm
asiņošana sākusies
grūtniecības audi sākuši izdalīties

Atcelts aborts

Ja paciente atsakās no aborta pirms procedūras pabeigšanas, pamata kods atspoguļo stacionēšanas iemeslu un Z53.2 — atteikšanos.

Stacionēšanas iemesls

Z34/Z35 vai attiecīgais O kods



Atcelšanas iemesls

Z53.2

Nejaušs un provocēts aborts

Dzemdes operācijas neizbēgama grūtniecības pārtraukšana un spontāns aborts pēc citas operācijas nav viena situācija.

Dzemdes operācija

O06._ sekundāri

Ar dzemdi nesaistīta operācija

pamata patoloģija primāri

O03._ sekundāri, ja notiek spontāns aborts

Asiņošana agrīnā grūtniecībā

O20._ lieto līdz 22. nedēļai tikai tad, ja grūtniecība nebeidzas ar abortu.

Grūtniecība turpinās

O20._

Grūtniecība atrisinās ar abortu

O00–O08

O21._ lieto tikai tad, ja vemšanai vajadzīga ārstēšana

Pārmērīga vemšana grūtniecības laikā jākodē tikai tad, ja tās dēļ nepieciešama ārstēšana vai stacionēšana.

Vagināla kandidoze grūtniecības laikā

Kodē grūtniecības komplikāciju, infekciju un tās izpausmi.

Grūtniecības kods

O23.5



Ierosinātājs

B37.3†



Izpausme

N77.1*

O26._ attiecas uz grūtniecības izraisītiem, citur neklasificētiem stāvokļiem

Pie O26._ sekundāri norāda pašu saistīto veselības stāvokli.

Anestēzijas komplikācijas kodu nosaka anestēzijas sākuma stadija

Izvēlas O29._, O74._ vai O89._ pēc tā, kad anestēzija tika uzsākta, nevis kad parādījās komplikācija.

Daudzaugļu dzemdību kodēšanas secība

Normālās daudzaugļu dzemdībās O84._ ir primārs, O30._ un Z37._ — sekundāri.

Dzemdības

O84._ primāri



Grūtniecības veids

O30._ sekundāri



Iznākums

Z37._ sekundāri

Intrauterīna augļa nāve

O36.4 lietošana atkarīga no tā, vai augļa bojāeja bija zināma pirms dzemdībām.

Bojāeja zināma pirms dzemdībām

O36.4
Z37._ papildus

Bojāeja nebija zināma

cits dzemdību kods
Z37._ norāda nedzīvi dzimušo

Dzemdības pirmsslimnīcas etapā

Ja paciente stacionēta pirms placentas piedzimšanas, epizodi joprojām kodē kā dzemdības.

Visi trīs periodi noslēgušies

pēc dzemdībām bez komplikācijām - Z39.0

pēc dzemdībām ar komplikācijām - kodē komplikācijas

Trešais periods nav noslēdzies

kodē kā dzemdības

O99 lieto tikai tad, ja blakusslimība sarežģī grūtniecību

Ne katra slimība grūtniecei ir O99 situācija.

Slimība sarežģī grūtniecību

O99._
komplicējošā patoloģija sekundāri

Slimība grūtniecību neietekmē

O99._ nelieto
grūtniecību var norādīt ar Z33–Z35

O99.0 vienmēr papildina ar anēmijas tipu

Ja anēmija patiešām sarežģī grūtniecību, pie O99.0 sekundāri norāda D50–D64.8.

Noslēguma atmiņa

XV nodaļā precīzu kodu nosaka epizodes pamatnotikums, gestācijas robeža un dokumentētā saistība ar grūtniecību.