

Faktori, kas ietekmē veselību un saskari ar veselības aprūpi

Mācība par Z kodu vietu pārbaudēs, turpmākā aprūpē, atceltās procedūrās un sociālu iemeslu epizodēs.

- Pārbaude
- Nēsāšana
- Turpmākā aprūpe
- Rehabilitācija
- Atcelta procedūra
- Sociāli iemesli

Prezentācijas fokuss

1

Kad Z kods drīkst būt primārā diagnoze

2

Kā atšķirt turpmāko aprūpi no jaunas komplikācijas

3

Kā kodēt atceltu procedūru

4

Kā atspoguļot sociālus stacionēšanas iemeslus

Z00–Z13 primāri lieto tikai tad, ja patoloģija nav konstatēta

Pārbaudes vai izmeklēšanas Z kods ir primārs tikai tad, ja epizodi nepamato diagnoze, komplikācija, ievainojums, symptoms vai patoloģiska atrade.

Neapstiprinātas aizdomas var noslēgties ar novērošanas Z kodu

Ja pēc novērošanas iespējamā saindēšanās neapstiprinās, epizodi var kodēt ar Z03.6.

Ko atcerēties

- nav jāatstāj neapstiprināta saindēšanās diagnoze

Skrīninga Z kods ir primārs tikai bez atrastas patoloģijas

Ja skrīningā patoloģiju nekonstatē, lieto Z12._; ģimenes anamnēzi norāda sekundāri.

Nēsāšanas kods neaizstāj ārstējamo stāvokli

Z20–Z29 primāri lieto tikai tad, ja nav citas diagnozes, kas pamato epizodi.

Turpmākas aprūpes epizodes pazīmes

Z48._ primāri lieto tad, kad akūtā ārstēšana ir pabeigta un komplikāciju nav.

Operācija jau veikta

- iepriekšējā stacionēšanas epizodē

Aktīvā ārstēšana pabeigta

- pamatslimību vairs aktīvi neārstē

Nav jaunas operācijas

- atkārtota ķirurģija nav vajadzīga

Aprūpe un atveseļošanās

- novērošana, brūces kopšana vai funkciju atjaunošana

Turpmākā aprūpe ar vai bez jaunas komplikācijas

Ja turpmākās aprūpes laikā rodas ārstējama patoloģija, tā kļūst par primāro diagnozi.

Komplikāciju nav

- Z48._ primāri
- ārstētā patoloģija sekundāri

Rodas pneimonija vai cita patoloģija

- jaunā patoloģija primāri
- Z48._ sekundāri

Z50._ un Z54._ atveseļošanās epizodēs

Ja galvenais mērķis ir rehabilitācija vai atveseļošanās pēc pabeigtas ārstēšanas, Z kods ir primārs.

Z50._

- aprūpe ar rehabilitācijas procedūrām

Z54._

- atveseļošanās

Preventīva operācija

Profilaktiskai ķirurģijai primāri norāda Z40._ un sekundāri — risku anamnēzē.

Operācijas mērķis

- Z40._ primāri



Riska pamatojums

- Z80–Z87 sekundāri

Paliatīva aprūpe ir sekundāra diagnoze

Z51.5 norāda sekundāri pacientiem, kuri saņem paliatīvu aprūpi.

Atcelta procedūra: izrakstīts vai turpina ārstēt?

Z53._ vietu nosaka tas, vai pēc atcelšanas pacientam turpina ārstēt citu patoloģiju.

Procedūra atcelta, ārstēšana nenotiek

- Z53._ primāri
- plānotās procedūras iemesls sekundāri

Stacionārā ārstē jaunā patoloģiju

- ārstējamā patoloģija primāri
- Z53._ sekundāri

Atceltas procedūras iemesls maina kodu secību

Atcelšana nav viena universāla situācija.

Kontrindikācija

- Z53.0

Personāla vai resursu trūkums

- Z53.8

Iemesls atrisinājies

- Z03–Z04 primāri + Z53.8

Procedūra uzsākta un pārtraukta

- kodē patoloģijas diagnozi

Sociāls iemesls var pagarināt stacionēšanu

**Z60.2 un Z75.1 norāda sekundāri, ja sociāls apstāklis vai gaidīšana
pagarina epizodi.**

Ko atcerēties

- Z60.2 — dzīvo viens
- Z75.1 — gaida vietu citā iestādē

Atvaļinājuma laika aprūpe ar vai bez akūtas slimības

Z75.5 ir primārs tikai tad, ja epizodes mērķis ir aprūpētāja atslogošana un jaunu ārstējamu problēmu nav.

Tikai atslogojoša aprūpe

- Z75.5 primāri
- hroniskais stāvoklis sekundāri

Rodas akūta slimība

- akūtā slimība primāri
- Z75.5 sekundāri

Noslēgums

Z kods drīkst būt primārs tikai tad, ja tas patiesi izskaidro epizodes galveno mērķi un nav konkrētākas ārstējamas patoloģijas.