

Specifiskas terapijas uzsākšanas/atcelšanas kritēriji MPS2:

EAT UZSĀKŠANAS KRITĒRIJI MPS II ĀRSTĒŠANĀ

1. Bioķīmiski un molekulāri apstiprināta MPS II diagnoze
2. Pacientu vecums, neatkarīgi no dzimuma, EAT uzsākšanas brīdī ir līdz piecu gadu vecumam
3. Visiem pacientiem, kas vecāki par pieciem gadiem, jāpiedāvā ārstēšana ar EAT.
Taču, ja šajā stadijā ir klīniskie dati par progresējošiem un nozīmīgiem neiroloģiskajiem traucējumiem un progresējošu kognitīvu deficītu, tad, ārstu konsīlijā, pēc pārrunām ar vecākiem, ir jāizlemj vai ir lietderīgi uzsākt ārstēšanu.
4. Vecākiem ir jāparaksta piekrišana, kurā informēti par terapijas uzsākšanas un atcelšanas kritērijiem.

EAT ATCELŠANAS KRITĒRIJI MPSII ĀRSTĒŠANĀ

EAT jāatceļ :

1. Smagi noritoša slimības gaita, kuru neuzlabo EAT;
2. Smaga EAT infūza nepanesība, kura nereaģē uz ieteikto premedikāciju;
3. Dzīvībai bīstama, neārstējama blakus slimība (piem., vēzis terminālā stadijā);
4. Grūtniecība/ krūts barošana.

Pacientiem ar smagi noritošu Hantera sindromu, EAT pārtraukšana jāapsver šādos gadījumos:

1. Ja pēc 6-12 mēnešu EAT lietošanas nav redzama uzlabojuma;
2. EAT provocēti uzvedības traucējumi;
3. Smagi, progresējoši neiroloģiskie traucējumi ar psihomotorās attīstības regresu.